CACES 2024 ENFERMERÍA

Paciente de 52 años con más de 40 años de evolución de diabetes mellitus, acude a Centro de Salud Tipo A con vasculopatia y retinopatía diabética. trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, usa habitualmente heparina. El personal de enfermería es el encargado de educar a la paciente sobre la forma y lugar de administración. ¿Cuál es la vía de administración de este medicamento?
Via intravenosa.
Via subcutánea.
Via intradermica.
Via intramuscular.

Formularios para llenar paciente que entra por emergencia para labor de parto de urgencia en cual se llena
053
008
051
056

Mujer de 40 años durante la visita domiciliaria refiere relaciones familiares conflictivas, hay una sola persona que trabaja ocasionalmente y los ingresos económicos no les permiten sustentar todos los gastos. ¿Qué tipo de determinante se menciona en el enunciado?

O Biológicos.
O Ambierntales
OConductuales.
O Sociales.

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?
Respuestas:
- Citostáticos, cloranfenicol, litio.
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

Dorothea Orem
Hidegard Peplau
Florence Nigtingale
Virginia Henderson

Paciente de 78 años, acude al centro de salud, con antecedentes de artritis reumatoidea diagnosticada hace 5 años, refiere intenso dolor en manos. Al examen fisico paciente presenta edema a nivel de falanges, eritema, aumento de la temperatura corporal y limitación en la articulación de manos. Por prescripción médica la enfermera administra Tramadol 100 mg y metoclopramida 10 mg, y se recomienda a la paciente continuar con las prescripciones médicas indicadas. ¿De acuerdo a la evidencia cuál sería el tratamiento inicial para esta paciente?

Uso de técnicas de neuro modulación o métodos ablativos como la estimulación nerviosa transcutánea.
Uso de Antiinflamatorios no esteroides (AINES) corticoides.
El uso de opioides débiles, inyectar ácido hialurónico en la articulaciones o plasma rico en
plaquetas.
Uso de compresas frías para generar una vasodilatación directa

En el puerperio encontramos diferentes subclasificaciones. ¿A qué etapa corresponde el tiempo que comprende desde el segundo dia del nacimiento hasta los 10 días de
postparto?
Respuestas:
Puerperio mediato.
Puerperio inmediato
Puerperio normal.
Puerperio tardio.

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?
Respuestas:
- Citostáticos, cloranfenicol, litio.
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

Dorothea Orem
Hidegard Peplau
Florence Nigtingale
Virginia Henderson

Paciente primigesta de 16 años, tuvo un parto céfalo vaginal sin complicaciones, dando un recién nacido de 2700 gr de peso, talla 50 cm, perímetro cefálico 33 cm, perímetro braquial 9 cm y perímetro toráxico 31 cm. La madre tiene mamas secretantes agrietadas, con pezones evertidos y siente mucho dolor al dar el seno. ¿Cuál es la técnica de agarre recomendada por el MSP para un correcto amamantamiento?

Respuestas:
- La boca del recién nacido está bien abierta, el labio inferior está evertido, el mentón está tocando el pecho, areola y pezón dentro de la boca.
- La boca del recién nacido está bien abierta, el labio superior está evertido, el mentón está tocando o el pecho, areola dentro de la boca.
- La boca del recién nacido está abierta, el labio inferior está invertido, el mentón está tocando el pecho, pezón dentro de la boca.
- La boca del recién nacido está semi abierta, el labio inferior está invertido, el mentón está tocando el pecho, areola dentro de la boca.

Cuáles son los síntomas fundamentales de la esquizofrenia según el DSM 5
O ACUmulación, delirio bizarro y atracones.
O Catatonia, Verborrea e ilusiones.
O Delirios, alucinaciones y habla desorganizada.
O Ilusiones, pensamientos erróneos y tristeza.

Paciente femenina de 20 años, que acude a la emergencia obstétrica, es valorada por el especialista. Los signos vitales se encuentran en los siguientes parámetros: TA= 130/70 mmHg, FR= 22 X´, FC= 86X´, FCF= 140 X´, al tacto vaginal se valora dilatación 10 cm y borramiento 100% membranas rotas. Ingresa a sala de partos, obteniendo un producto único vivo mediante parto eutócico (período expulsivo), para luego pasar a

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?
Respuestas:
- Citostáticos, cloranfenicol, litio.
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

Dorothea Orem
Hidegard Peplau
Florence Nigtingale
Virginia Henderson

la tercera etapa del trabajo del parto (alumbramiento). Usted como profesional de enfermería conocedor de las normas del MSP. ¿Cuál de las siguientes actividades se debe realizar para cumplir con los pasos del manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto?
Respuestas:
- Administración de 10UI de oxitocina IM stat, tracción controlada del cordón, con contra tracción (presión suave) del fondo uterino y masaje uterino después de la liberación de la placenta.
- Tracción controlada del cordón umbilical y masaje uterino.
- Administración de 10UI de oxitocina IM stat, tracción controlada del fondo uterino.
- Administración de 20 UI de oxitocina IM stat y tracción controlada del cordón.

Usted es el coordinador

9.- Relacione las complicaciones de las km intervenciones coronarias percutáneas con las acciones de enfermeria

COMPLICACIONES	ACCIONES DE ENFERMERÍA
1.isquemia del miocardio	A. Suspender el anticoagulante y notificar
2.- hemorragia y formación de hematoma	B. Aportar hidratación adecuada
3.- insuficiencia renal aguda	C.aplicar compresión manual
4.- hematoma retroperitoneal	D. Administrar oxígeno y nitroglicerina

Respuestas:?
1a-2b-3d-4c

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?
Respuestas:
- Citostáticos, cloranfenicol, litio.
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

Dorothea Orem
Hidegard Peplau
Florence Nigtingale
Virginia Henderson

1d-2c-3b-4a
1c-2d-3a-4b
1b-2a-3c-4d

10.- **Un paciente masculino de 28 años, acude a consulta externa por presentar desde hace tres días, distagia y odinofagia acompañada desde hace 24 horas de fiebre y escalofrío. A la exploración física presenta orofaringe hiperémica, amígdalas aumentadas de tamaño con criptas pustulosas bilateralmente; inmediatamente facultativo toma una muestra y envía para cultivo y antibiograma, en el examen de laboratorio demuestra crecimiento Streptococcus pyogenes, sensible penicilina y ciprofloxacina, el médico prescribe penicilina procaínica y benzatínica intramuscular, pese al deseo del paciente de no querer recibir medicamento con ese tipo de vía de administración, estableciendo que es mejor para él y su bienestar este procedimiento. ¿Qué relación clínica se establece en este caso?**
1.-Paternalistas
2.-interpretativo
3.deliberativo
4.informativo

7.- Cuales son los sintomas fundamentales de la esquizofrenia según el OMS

- Acumulación, delirio bizarro y atracones.
- Catatonia, verborrea e ilusiones.
- Delirios, alucinaciones y habla desorganizada.
- Ilusiones, pensamientos erróneos y tristeza.

8.- Paciente masculino de 56 años con diagnóstico de cáncer de prostata en atopia terminal encuentra en la unidad de cuidados paliativos en compañía de familiares. En voice nocturna se reporta el inicio del cese de las funciones respiratorfos,

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?
Respuestas:
- Citostáticos, cloranfenicol, litio.
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

Dorothea Orem
Hidegard Peplau
Florence Nigtingale
Virginia Henderson

degeneracion de masa cerebral, ausencia de reflejos, luego de 15 minutos el paciente fallece protetor de enfermería se prepara para proporcionarle los cuidados postmorteni, antes de que of contine consistente, debido al cambio de pH y ausencia de ácido adeninfosfóricco postmortem a la que se refiere?

- Descompensación
- Lividez cadavérica o curacion cianotica
- Rigor mortis
- Algor mortis

10.- Paciente asmatico que en la mañana limpió la casa usando el aromatizante de skarpo y kenarka al gimnasio a su sesión regular de spinning. En la tarde presentó lumbalgia par lo que se automedico con COX1 y COX2 los cuales no había utilizado anteriormente. En la noche es llevada a urgencias con episodio de asma con compromiso vital que requirió intubación. ¿Cuál de los factores mencionados es más probable que haya condicionado el evento asmático severo?

- Ácaros.
- Ejercicio.
- Antiinflamatorios.
- Aromatizantes.

11.- Una paciente femenina de 16 años cursa un embarazo de 36.5 semanas según la ecogratia del primer trimestre, Ingresa al hospital en expulsivo, parto céfalo vaginal, Se recibe un recién nacido masculino con llanto fuerte, frecuencia cardiaca 140 ipm. Apgar 9. Liquido amniótico de mal olor. Rotura de merribranas de 21 horas. ¿Qué factores de riesgo para infección presenta el recién nacido?

- Liquido armniótico transparente con grumos.

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?
Respuestas:
- Citostáticos, cloranfenicol, litio.
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

Dorothea Orem
Hidegard Peplau
Florence Nigtingale
Virginia Henderson

- Parta cétalo vaginal, en expulsivo.
- Rotura de membranas de 21 horas.
- Madre adolescente.

12.- Un paciente masculino de 18 años sin antecedentes patológicos acude a consulta porque desde hace 3 meses presenta "barros y espinillas" en la cara en moderada cantidad, en algunas ocasiones causan dolor. Ha utilizado jabones con antibiótico de venta libre sin mejoría. En el examen físico: signos vitales estables, presencia de lesiones compatibles con comedones abiertos y cerrados en moderada cantidad ubicados en toda la cara, 2 lesiones papulopustulosas aisladas ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente?

- Acné grave.
- Acné conglobata.
- Acné leve.
- ACNÉ MODERADO.

13.- Un recién nacido de 48 horas de vida recibe atención en emergencia por cuadro de distensión abdominal, acompañado de vómitos por varias ocasiones de contenido bilioso y ausencia de meconio. Sus antecedentes personales incluyen pollhidramnios. nacimiento por parto vaginal a las 39 semanas de gestación. Al examen fisico FC:160/min FR:50/min T/A:60/40 mmHg, temperatura:36°C. El abdomen se encuentra distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos. Ano permeable. La radiografía de abdomen muestra asa de intestino delgado distendido, escaso aire en colon. ¿Cuál es el diagnóstico probable del paciente?

- Ileo meconeal
- Divertículo de Meckel.
- Enterocolitis necrotizante.
- Intususcepción.

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?
Respuestas:
- Citostáticos, cloranfenicol, litio.
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

Dorothea Orem
Hidegard Peplau
Florence Nigtingale
Virginia Henderson

14.-Señale que trazo representa la despolarización de los ventrículos en el EKG:

- Onda P.
- Segmento ST.
- Onda T.
- Complejo QRS.

15.- Paciente de 2 meses de edad, traído por su madre a emergencias por fiebre e iritabilidad de 5 días de evolución. La fiebre es de 39 grados centigrados, varios picos al día, de difícil control con antitérmicos, se acompaña de gran imitabilidad. Acudió a pediatra, quien prescribió acetaminofén alternado con ibuprofeno, sin mejoría. Al examen físico signos vitales normales, paciente en regular estado general, Imitable, fontanela anterior normotensa, no signos de focalización intecciosa. Exámenes: leucocitos 15.000/mm3, neutrófilos 70% hemoglobina 11 gr/dl, plaquetas 200.000/mm3, proteina C reactiva 100 mg/L, elemental y microscópico de orina tomado por sonda vesical: leucocitos +++, nitritos positivo. bacterias: bacilos gram negativos +++, urocultiva pendiente resultado. ¿Cuál es la conducta a tomar con este paciente?

- Hospitalizarlo sin antibióticos hasta recibir resultado de urocultivo.
- hospitalizario con ceftriaxona întravenosa.
- Observarlo 8 horas para decidir si se lo envía a casa u hospitaliza.
- Realizar punción vesical comprobar el diagnóstico y decidir conducta.

16.- ¿Cuál es el conjugado que mide 10.5 cm de diámetro anteroposterior y corresponde a la distancia más reducida entre el promontorio y el pubis?

- Anatómico.
- Diagonal.
- OBSTÉTRICO.
- Verdadero.

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?

Respuestas:
- Citostáticos, cloranfenicol, litio.
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

Dorothea Orem
Hidegard Peplau
Florence Nigtingale
Virginia Henderson

Una paciente femenina de 16 años Cursa un embarazo de 36.5 semanas según la ecografía del primer trimestre. ingresa al hospital en expulsivo. parto céfalo vaginal Se recibe un recién nacido masculino con llanto fuerte, frecuencia Cardiaca 140 lpm. Apgar 9. Uquido amniótico de mal olor Rotura de membranas de 21 horas. Que factores de riesgo para Infección presenta recien nacido?
O Líquido amniótico transparente con grumos.
O Parto céfalo vaginal, en expulsivo.
O Rotura de membranas de 21 horas.
O Madre adolescente.

Gestante de 38 años, se encuentran hospitalizada en el servicio de Gíneco-obstetricia, con diagnóstico de embarazo ectópico accidentado. ¿Cual es el examen de laboratorio?

Gonadotropina coriónico humana (HCG) fracción beta menor a 5000 mUI/ml
Gonadotropina coriónica humana cualitativa ++
Gonadotropina coriónica cualitativa negativa.
Gonadotropina coriónica humana fraccionada beta mayor a 5000 mul/ml.

En el transquirúrgico de una Laparotomia Exploratoria y antes del cierre de la herida quirúrgica, los profesionales enfermeros circulante e instrumentista, realizan el conteo de material blanco y se percatan que falta una compresa. ¿Cuál es la primera acción que debe realizar?

- Informar al cirujano y repetir el recuento.

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?
Respuestas:
- Citostáticos, cloranfenicol, litio.
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

Dorothea Orem
Hidegard Peplau
Florence Nigtingale
Virginia Henderson

- Iniciar la búsqueda
Solicitar una radiografia
- Realizar el informe del incidente.

Un metaparadigma es un conjunto de conceptos globales que identifican los fenómenos particulares de interés para una disciplina. ¿Cuáles son los conceptos globales del metaparadigma enfermero?

Persona, entorno, cuidado v salud.
Entorno, teorius, cuidado y enfermeria.
Cuidado, enfermeria, relaciones y salud,
Salud, persona, enfermeria y cuidado

Al realizar la medición de la temperatura oral a un paciente, usted debe cerciorarse que este no haya ingerido alimentos, líquidos calientes o fríos, o haya fumado en un espacio de tiempo de:

Respuestas:
30 minutos.
20 minutos.
10 minutos.
15 minutos

Paciente primigesta de 20 años, cursa un embarazo de 39 semanas, ingresa al hospital acompañada del familiar, quien refiere que hace 6 horas antes de su ingreso, presentó: dolor abdominal tipo contracción uterina, lentas y constantes; eliminación de moco cervical teñido de sangre; está ansiosa. Es valorada por un médico de turno, reporta: dilatación de 2 centímetros, borramiento de 40%, membranas integras,

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?
Respuestas:
- Citostáticos, cloranfenicol, litio.
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

Dorothea Orem
Hidegard Peplau
Florence Nigtingale
Virginia Henderson

eliminación de moco cervical sanguinolento en moderada cantidad, frecuencia cardiaca fetal 160 latidos por minutos, pulso 96 por minuto, presión arterial 120/70, temperatura de 36,5 grados centígrados, respiración 20 por minuto. Se le envía a casa con indicaciones. ¿En qué momento de su periodo de maternidad se encuentra la paciente?
Primera etapa del trabajo de parto, fase latente de la labor de parto.

¿Cómo se denomina a la actividad quirúrgica cuya indicación surge como consecuencia de una patología aguda grave de la madre o del feto, con riesgo vital materno-fetal, que hace aconsejable la finalización del embarazo rápidamente?

Cesárea de urgencia.

De las siguientes opciones¿cual es correcta con relacion a la administracion y lectura de la tuberculina?

administrar la tuberculina por via intradermica y realizar la lectura a las 48 -72 horas

La gasometría arterial es una técnica de monitorización respiratoria que permite identificar la alteración del equilibrio ácido básico. ¿Qué trastorno se pone de manifiesto teniendo en cuenta los siguientes datos? pH= 7.30;PaCO2.= 48 mmHg; PaO2.= 83 mmHg;H2CO3.= 20 meq/l.
- Acidosis respiratoria.
- Alcalosis respiratoria.
- Acidosis metabólica.
- Alcalosis metabólica.

En el puerperio encontramos diferentes subclasificaciones. ¿A qué etapa corresponde el tiempo que comprende desde el segundo día del nacimiento hasta los 10 días de postparto?

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?
Respuestas:
- Citostáticos, cloranfenicol, litio.
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

Dorothea Orem
Hidegard Peplau
Florence Nigtingale
Virginia Henderson

Puerperio inmediato.
- Puerperio normal.
- Puerperio mediato.
- Puerperio tardío.

Florence Nightingale es reconocida como la impulsora de la Enfermería profesional organizada. ¿Cuál de los siguientes hitos históricos está relacionado con este personaje?

La Guerra de Crimea.
- Guerra Civil española.
- Las cruzadas de la Edad Media.
- Edad Antigua.

Usted es coordinador del servicio de enfermeria y le han asignado la responsabilidad de habilitar el área de quemados, el director del hospital le indica que han adquirido equipos y materiales para el funcionamiento, luego de revision de los mismos usted indica que necesita otros insumos, pero no hay presupuesto, usted pone en marcha el servicio utilizando los recursos disponibles ¿ como se denomina este concepto? eficacia asignada

efectividad
eficiencia
eficacia

De las siguientes opciones, ¿cual es correcta con relación a la administración y lectura de la tuberculina?
Respuestas:

Administrar la tuberculina por via intradermica y realizar la lectura a las 48-72 horas.
Administrar la tuberculina por vía subcutanea y realizar la lectura a las 24-48 horas

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?
Respuestas:
- Citostáticos, cloranfenicol, litio.
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

Dorothea Orem
Hidegard Peplau
Florence Nigtingale
Virginia Henderson

Administrar la tuberculina por vía intramuscular y realizar la lectura de 48-72 horas
Administrar la tuberculina por via intradermica y realizar la lectura a las 8-12 horas

Cuadro caracterizado por otalgia, otorrea, purito a nivel de oido en la audicion derecha. Al examen fisico presenta dolor a titrar el pabellon auricular derecho para el examen otoscopio, eritema, edema y detritos en el conducto externo. ¿cual es el diagnostico presuntivo?

a)otitis externa
B) otitis media
c) colesteatoma adquirido
d)carcinoma cutaneo

Como parte del grupo de investigacion del lugar en el cual trabaja como profesional de enfermeria le han asignado validar la efectividad de un nuevo protocolo de atención en enfermería para reducir las infecciones intrahospitalarias. ¿ Cual es el tipo de investigación confiables en este caso?

Investigación correlacional

Paciente atendido en emergencia luego de accidente de tránsito, es diagnosticado de shock hipovolémico, médico prescribe la administración de paquetes globulares. Durante la administración, el paciente presenta un shock anafiláctico, paro cardio respiratorio que no revierte pese a maniobras de RCP, por colocar paquete globular equivocado. ¿Cómo se denomina la situación descrita?

- Evento centinela.

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?
Respuestas:
- Citostáticos, cloranfenicol, litio.
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

Dorothea Orem
Hidegard Peplau
Florence Nigtingale
Virginia Henderson

- Evento adverso.
- Reacción adversa.
- Fallas latentes.

Eliminaron?

En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?

Respuestas:
- Citostáticos, cloranfenicol, litio.
- Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

Dorothea Orem
Hidegard Peplau
Florence Nigtingale
Virginia Henderson